Par M. perfait Chirurgien major de vaisseau.

N.° 203

Trepan avec succès.

Un jeune matelot agé de 20 ans, d'un mauvais temperament, foible et cacochime, de Caractère très indolent, vint se plaindre le dix sept juillet dix sept cens quatre vingt d'une tumeur située sur la partie moyenne du pariétal droit. Ce jeune homme malgré sa mauvaise constitution n'avoit eut précédemment aucune maladie, ni accident; il avoit alors quelques Echimoses Scorbutiques aux cuisses et aux jambes qui ne laissoient aucun doute sur la nature de sa maladie. (a)

Cette tumeur étoit circonscrite peu élevée, pâteuse, avec un peu de fluctuation au centre, d'environ deux pouces de diamètre et les tegumens de ce cotté de la tete Oedematiés. il y avoit un peu de fievre, la langue un peu chargée, le malade ne se plaignant que d'inapétance et de beaucoup de foiblesse.

Cette tumeur avoit parût lentement, et il y avoit très peu de jours quelle lui étoit sensible, il n'avoit jamais éprouvé aucunes douleurs à la tete, il n'avoit jamais ~~fait~~ de chûte, n'avoit point reçut de coup, il avoit seulement éprouvé, quelques jours avant, de legers

(a) C'est après une traversée de 71 jours, d'Europe à la nouvelle angleterre que ce jeune homme éprouva ces accidens:

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 45 dr. 4 n.° 110

frisons de fièvre.
le peu de fluctuation du Centre de la tumeur, me paruût susceptible de résolution, étant une suitte de la dégénérescence du fluide stagnan. je mis le malade au régime végétal et aux sucs des végétaux anti-scorb.^{ques} et fis appliquer des cataplasmes de plantes aromâtiques fraiches sur tout ce Côtté de la têté, afin de résoudre la tumeur et l'infiltration. le lendemain il fût purgé et on Continua les autres moyens. le 20 nous reçûmes ordre de transporter nos hôpittaux sur une autre Ile, parceque l'on craignoit une déceste des Ennemis sur celle cy. le 21.^{e} je me transportai avec ceux de mes malades qui avoient les maladies les plus grâves, ce qui fit que je ne revis ce jeune homme que le 25.^{e} il étoit toujours foible, mais sans fièvre et commençoit à sentir un peu d'appetit, je lui augmentai ses alimens. quant à la tumeur le Centre en étoit un peu plus suppuré. Je fis une incision pour donner issuë à la matière et découvrir l'os que je jugai être ~~dénudé~~ dénué; il l'étoit effectivement, je fis l'incision cruciale et de toute l'étenduë de la tumeur, afin de mettre l'os

à découvert, il sortit de cette double incision, dont une
paralelle à la suture sagitalle et l'autre
perpendiculaire à la squammeuse, commençant à la
sagitalle, il en sortit deux bonnes cuillerées d'un pus
en partie sereux et sanguinolent. l'os étoit d'un
blanc très pâle et n'avoit aucune tuméfaction. je
discontinuai le suc Anti-scorb.^e et le remplacai
par une verrée d'infusion de Kina et de Camomille,
Acidulée avec le suc d'oseille, donnée matin et
soir, et continuant les mêmes Cataplasmes.
le 26.^e les chairs paroissoient s'être vivifiées
et l'infiltration des teguments dissipée, en partie.
mais pour hâter l'Exfoliation que je crus indispens-
-able, je perforai l'os à la manière de Belloste
et pour pansement, un plumaceau imbibé
d'Essence de thérébentine, recouvert par le
Cataplasme aromatique. je continuai ainsi
jusqu'au dix neuf aoust, où je supprimai le
Cataplasme, le tout étant en bon état et
jusqu'au vingt six le reste du pansement, l'os

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

s'étoit recouvert sans exfoliation sensible, C.a.d, que les boutons charnus s'étoient formés de proche en proche par les trous faits par la piramide du trépan, s'étoient réunis et avoient recouvert l'os. le 27 à l'angle postérieur et inférieur de la double incision, il s'étoit formé un sinus d'où il sortit beaucoup de pus, ce sinus s'étendoit obliquement et postérieurement jusque vers la suture lamdoïde, à l'endroit où se réunit l'occipital avec l'angle postérieur et inférieur du pariétal et jusqu'où l'os étoit dénué de la largeur d'un demi pouce. je l'incisai, de même qu'un autre qui s'étendoit de l'extrémité antérieur de l'incision paralelle à la suture sagitalle et obliquement jusque l'angle antérieur et inférieur du pariétal, où l'os étoit dénué de la même manière. le 28 je voulus perforer comme j'avois déja fais, mais vers le milieu de l'incision postérieur faite le 27 l'os étoit plus altéré et marqué d'une tache noiratre, sa substance ramollie et spongieuse,

de la grandeur d'une pièce de 24.l environ, cequi me
porta à croire que la Cause de cette altération étoit
Sous le Crâne et non dans la Substance de l'os,
Comme je l'avois crus aprés l'incision faite, puisque
aucun accident n'avoit indiqué, ni fait Soupçonner
la lésion des parties internes. En Conséquence je me
déterminai à perforer le Crâne dans l'endroit le
plus affecté, pour me guider plus Surement d'aprés
Cet examen. dés que j'eus pénétré les deux tables,
il Sortit par cette ouverture du pus et avec le
mouvement que lui imprimoit le Cerveau; alors
assuré du foyer de la maladie et de Sa nature,
j'appliquai à l'endroit même, une couronne de
trépan, d'où il Sortit environ trois cuillerées, d'un
pus blanc, Consistant et presque inodore, la dure-
-mere étoit légérement affecté. je pansai de
Manière à laisser au pus la liberté de Sortir
pendant l'intervalle des pansements et je fis
Coucher le malade de ce Côté. je Continuai le
même régime en diminuant un peu la quantité

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et lui fis prendre quatres verrées d'infusion de Kina
et de Camomille acidulée et pour boisson ordinaire
la Sapinette coupée de partie égalle d'eau. les
mêmes moyens furent Continués jusqu'au vingt quatre
d'aoust, où le malade étant très bien, la suppuration
presque tarie, les forces et l'appetit augmentant
toujours, les os dénués Commençant à s'ébranler,
j'augmentai les alimens et discontinuai l'infusion.
le quatre septembre j'enlevai de l'os découvert à
l'endroit du trépan, plus d'un pouce quarré et
Environ autant de l'os découvert dans la
derniere incision, non seulement de la table
externe, mais presque autant de l'interne, ce qui
tailloit ces deux pièces d'os obliquement sur
leurs bords. Ces deux pièces d'os Enlevées mettant
une partie assez Considérable du Cerveau à découvert,
je fis porter au malade une Calotte de Carton
afin de garantir les parties internes.

La dure-mere se couvrit bientôt de bourgeons charnus, les bords dela plaie s'affaisserent et le vuide se remplit en fort peu de tems. le dix huit septembre la Cicatrice étant très avancée j'envoyai le malade àla Campagne dans un hôpital de convalescents; il est revenu à bord le 29.e octobre en très bonne santé et dont il a joüi depuis, même au delà de cequ'il en ait jamais fait.

le trente et un may dix sept cens quatre vingt deux ce jeune homme Eprouva une légère attaque d'Epilepsie, qui dura environ sept à huit minutes.

le trois aoust suivant au désarmement du vaisseau, il vint me trouver, avec une grande Envie d'avoir un Congé absolu, en allégant que dans les voyages précédents, à terre neuve, il avoit Eprouvé plusieurs attaques d'Epilepsie, cequ'il ne m'avoit jamais dit avant, malgré toutes les Questions que je lui avoient faites antérieurement relativement à sa maladie./.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE